



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Θεματική ενότητα 1 : ΕΚΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ

Ελληνικές φυλές προβάτων 2/2
ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για το μέλλον
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ





Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

- Η προσαρμοστική ικανότητα του προβάτου σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση, τις γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες και την παρέμβαση του ανθρώπου είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού αυτόχθονων φυλών.
- Οι φυλές περιγράφονται ως προς τα μορφολογικά και παραγωγικά τους χαρακτηριστικά.
- Με βάση το μέγεθος του πληθυσμού διακρίνονται σε κυρίαρχες και σπάνιες.



Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

- Η γνωριμία με τις σημαντικότερες αυτόχθονες φυλές προβάτων που εκτρέφονται σε σχετικά μικρούς αριθμούς και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης (σπάνιες φυλές).



Μαθησιακοί στόχοι

Οι κυριότερες σπάνιες φυλές είναι οι παρακάτω:

Σερρών, Καρύστου, Καλαρρύτεκη, Πηλίου, Κύμης,

Γλώσσας Σκοπέλου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σητείας,

Κεφαλονιάς, Φλώρινας (Πελαγονίας), Ορεινή

Ηπείρου, Ζακύνθου, Θράκης, Σαρακατσάνικη,

Ανωγείων, Αστερουσίων, Άργους, Ευδήλου Ικαρίας,

Σαμοθράκης, Καταφυγίου.



Λέξεις – έννοιες κλειδιά

- Σπάνιες φυλές προβάτων, αυτόχθονη φυλή
- Rare sheep breeds, indigenous breed



Πρόβατο ΣΕΡΡΩΝ 1/3

- Εκτρέφεται στην πεδιάδα του νομού Σερρών.
- Τα αμιγή ποίμνια δεν υπερβαίνουν τα 100 και το σύνολο των εκτρεφόμενων προβάτων τα 12.000.
- Στην ίδια περιοχή εκτρέφονται και ποίμνια με υψηλό ποσοστό προβάτων της φυλής.
- Ο συνολικός αριθμός των Σερραϊκών προβάτων εκτιμάται γύρω στα 25.000 άτομα .



Πρόβατο ΣΕΡΡΩΝ 2/3

- Μέσου έως μεγάλου σωματικού μεγέθους
- Υ.Α.: κριοί 75 cm, προβατίνες 67 cm
- Σ. Β: κριοί 85 kg,
- προβατίνες 61 kg
- χρωματισμός ομοιόμορφος
- Το 70% περίπου των προβάτων είναι λευκά με μαύρο χρώμα στην κεφαλή, την κάτω τραχηλική χώρα, τα άκρα και την κάτω κοιλιακή χώρα.
- ομοιόμαλλο



Προβατίνες Σερρών (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο ΣΕΡΡΩΝ 3/3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Σχετικά πρώιμη φυλή
- Δείκτης πολυδυμίας : 1,2 - 1,5
- Γαλακτοπαραγωγή : 100 - 130 kg



Ποίμνιο της φυλής
Σερρών (αρχείο
Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Φυλή Καρύστου 1/3



Κριάρι (αριστερά) και προβατίνα (δεξιά) της φυλής Καρύστου (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Καρύστου 2/3

- Μικρόσωμο πρόβατο
- Υ.Α.: κριοί 64cm, προβατίνες 59cm
- Σ. Β. : κριοί 60 kg, προβατίνες 40 kg
- λευκός χρωματισμός εκτός από τα μη καλυπτόμενα από έριο μέρη που είναι κατά 70% «κοκκίνικα» (ερυθρό χρώμα) και 30 % «βακρίνικα» (μαύρο χρώμα)



Φυλή Καρύστου 3/3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Μέσο μέγεθος ποιμνίων : 150 ζώα
- Πρώτος τοκετός: 18 μηνών
- Δείκτης πολυδυμίας : 1,1- 1,2
- Η αμελγόμενη ποσότητα γάλακτος : 80 – 100 kg ανά προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Καλαρρύτεκη φυλή 1/3

- Εκτρέφεται στους Καλαρρύτες και το Συρράκο σε 10 ποίμνια με μόλις 2.800 ζώα. Τα ποίμνια είναι μετακινούμενα (το καλοκαίρι στην οροσειρά των Τζουμέρκων και το χειμώνα σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας- Τύρναβος, Βλωχός, Αμφιθέα ή του Ακτίου).



Κριός της Καλαρρύτεκης φυλής (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Ποίμνιο με Καλαρρύτεκα πρόβατα (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Καλαρρύτεκη φυλή 2/3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μικρόσωμο
- Υ.Α.: κριοί 67 cm, προβατίνες 60 cm
- Σ. Β: κριοί 64 kg, προβατίνες 45 kg
- αναμικτόμαλλο
- χρωματισμός ομοιόμορφος (λευκά με κοκκινόφαιες κηλίδες στις παρειές του προσώπου, γύρω από το στόμα και τα αυτιά).
- Ιδιαίτερα ευρύ στήθος (η φυλή υπερέχει κρεοπαραγωγικά)



Καλαρρύτετικη φυλή 3/3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πρώιμοι τοκετοί (Οκτώβριο - Νοέμβριο)
- Δείκτης πολυδυμίας : ~ 1,3 – 1,4
- Γαλακτοπαραγωγή: 80 - 100 kg ανά προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Προβατίνες Καλαρρύτετικης φυλής
(αρχείο Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Πηλίου 1/3

- Εκτρέφεται στο Νομό Μαγνησίας περίπου 2.000 άτομα (30 εκτροφείς με 10- 200 πρόβατα ο καθένας).



Πρόβατα Πηλίου (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Πηλίου 2/3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μικρόσωμο
- Υ.Α.: κριοί 63 cm, προβατίνες 58 cm
- Σ. Β: κριοί 59 kg, προβατίνες 43 kg
- Αναμικτόμαλλο, δασύ, πλούσια προκόμη
- χρωματισμός ομοιόμορφος (κιτρινόφαιο χρώμα κυρίως, λίγα ζώα με κοκκινόμαυρο χρώμα στο κεφάλι ή σε όλο το σώμα)
- Αυτιά μικρά (70 %), ελλείπουν (15 %) ή είναι μετρίου μεγέθους (15 %)



Πρόβατο Πηλίου 3/3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Τοκετοί από Δεκέμβριο έως Ιανουάριο
- Τοκετοί δίδυμοι σε ποσοστό 10 – 15 %
- Γαλακτοπαραγωγή: 80 - 100 kg ανά προβατίνα και αμελκτική περίοδο 120 ημερών



Κριός Πηλίου (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Κύμης 1/2

- Πολύδυμη φυλή με υψηλή γαλακτοπαραγωγή
- Στην περιοχή της Κύμης Ευβοίας υπάρχουν 18 αμιγή ποίμνια με συνολικό αριθμό προβάτων περίπου 600
- Ένα άλλο ποίμνιο εκτρέφεται στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Μουδανιών Χαλκιδικής



Φυλή Κύμης από το ποίμνιο στο Σταθμό Χαλκιδικής (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Κύμης 2/2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ✓ Μέσης σωματικής ανάπτυξης
- ✓ Υ.Α.: κριοί 69 cm, προβατίνες 65 cm
- ✓ Σ. Β.: κριοί 73 kg, προβατίνες 66 kg
- ✓ Λευκός χρωματισμός σε όλο το σώμα, εκτός από τα αυτιά, το στόμα, γύρω από τους οφθαλμούς και σε πολλές περιπτώσεις στις παρειές του προσώπου, όπου είναι μαύρος ή φαιόμαυρος

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πρώιμη φυλή
- Τοκετοί δίδυμοι σε ποσοστό 80%
- Γαλακτοπαραγωγή : 150 – 170 kg κατά προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Πρόβατο Γλώσσας ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1/3

- Εκτρέφεται κυρίως στη Σκόπελο, αλλά και στη Σκιάθο και στην περιοχή του Βελεστίνου, με συνολικό αριθμό 1800 περίπου προβάτων, ενώ άλλα 1000 πρόβατα περίπου εκτρέφονται σε ποιμνία στα οποία υπάρχουν και άλλες φυλές ή είναι διασταυρωμένα.



Πρόβατο φυλής Σκοπέλου (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Γλώσσας ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2/3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μέσης σωματικής ανάπτυξης
- Υ.Α.: κριοί 66cm, προβατίνες 61 cm
- Σ. Β.: κριοί 65 kg, προβατίνες 55 kg
- Η ράχη παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό κύρτωμα ή «σέλλωμα»
- Χρωματισμός ομοιόμορφος (λευκός χρωματισμός εκτός από τα αυτιά, το στόμα και γύρω από τους οφθαλμούς, όπου παρουσιάζουν μαύρο και ενίοτε κοκκινόμαυρο χρώμα)
- Ομοιόμαλλο



Πρόβατο Γλώσσας ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3/3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πρώιμη φυλή
- Τοκετοί σε ποσοστό 60 έως 70% δίδυμοι
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 170 kg/ προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Πρόβατο Κατσικά Ιωαννίνων 1/2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μέσης σωματικής διάπλασης
- Υ.Α.: κριοί 70 cm, προβατίνες 61 cm
- Σ.Β.: κριοί 69 kg, προβατίνες 49 kg
- Αναμικόμαλλο
- Ομοιόμορφος χρωματισμός (λευκά με μελανές κηλίδες σε αυτιά, μάτια, παρειές, στόμα)



Πρόβατο Κατσικά Ιωαννίνων
(αρχείο Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Κατσικά Ιωαννίνων 2/2

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πρώιμη φυλή (οι αμνάδες εισέρχονται στην ήβη κατά τον δέκατο μήνα της ηλικίας τους)
- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,3
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 130 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Πρόβατο Κεφαλονιάς 1/2

- Σε αμιγή εκτροφή ~ 2000 άτομα στην Κεφαλονιά.
- Μικρόσωμο
- Υ.Α.: κριοί 65 cm, προβατίνες 60 cm
- Σ.Β.: κριοί 58 kg, προβατίνες 44 kg
- Αναμικτόμαλλο
- Ομοιόμορφος χρωματισμός (λευκά με κοκκινόφαιο χρώμα σε κεφαλή, κοιλιά, κάτω μέρος τραχήλου και άκρα)



Προβατίνα Κεφαλονιάς (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Κεφαλονιάς 2/2

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο κύριος όγκος των τοκετών τους μήνες
Νοέμβριο - Δεκέμβριο
- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,1
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 177 kg / προβατίνα και
αμελκτική περίοδο



Φυλή Φλώρινας (Πελαγονίας) 1/2

- 650 καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής εκτρέφονται στο Σταθμό Κοίλων Κοζάνης
- Μέσου έως μεγάλου σωματικού μεγέθους
- Υ.Α.: κριοί 72 cm, προβατίνες 67 cm
- Σ. Β.: κριοί 76 kg, προβατίνες 60 kg
- Λευκός χρωματισμός στο σώμα, μελανός δακτύλιος γύρω από τους οφθαλμούς ή μαύρες κηλίδες στα αυτιά, το στόμα και τα άκρα
- Ομοιόμαλλο



Πρόβατα φυλής Φλώρινας (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Φλώρινας (Πελαγονίας) 2/2

- Πρώιμη φυλή (οι αμνάδες εισέρχονται στην ήβη κατά τον δέκατο μήνα της ηλικίας τους)
- Τοκετοί συχνότερα τον Ιανουάριο
- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,2 -1,5
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 95 - 106 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Ορεινή Ηπείρου (Βλάχικη) 1/3

- Συναντάται στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου. Έχει επηρεαστεί από το Σαρακατσάνικο και το Γραμμουσιανό πρόβατο. Στις περιοχές αυτές ονομάζεται Μπούτσικο. Ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 3.000-5.000 άτομα.
- Σε ορεινές περιοχές στη Βορειοδυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Κεντρική Πελοπόννησο εκτρέφεται σε αμιγή μορφή σε μικρό σχετικά αριθμό ποιμνίων ως Βλάχικο.



Ορεινή Ηπείρου (Βλάχικη) 2/3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μικρόσωμο πρόβατο
- Υ.Α.: κριοί 65 cm, προβατίνες 58 cm
- Σ. Β. : κριοί 56 kg, προβατίνες 46 kg
- μεγάλη παραλλακτικότητα στο χρωματισμό του τριχώματος ο οποίος παραλλάσσει από τον εντελώς λευκό έως τον εντελώς μαύρο.



Προβατίνα Μπούτσικης φυλής (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Ορεινή Ηπείρου (Βλάχικη) 3/3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Δείκτης πολυδυμίας : 1, 1
- Η αμελγόμενη ποσότητα γάλακτος : 80 – 90 kg ανά προβατίνα και αμελκτική περίοδο
- Το Μπούτσικο διατηρεί τα βασικά γνωρίσματα του Βλάχικου προβάτου
- Η γαλακτοπαραγωγή των ελεγχόμενων Μπούτσικων προβάτων από το κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ιωαννίνων ανέρχεται γύρω στα 114 kg



Προβατίνα και αμνός της Μπούτσικης φυλής (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Ζακύνθου 1/2

- ❖ Στο ομώνυμο νησί υπάρχουν περίπου 550 πρόβατα.
- ❖ Επίσης 85 πρόβατα υπάρχουν στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Μουδανιών Χαλκιδικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Λεπτόουρο-αναμικτόμαλλο
- Μεγαλόσωμο
- Υ.Α.: κριοί 83 cm, προβατίνες 75 cm
- Σ.Β.: κριοί 83 kg, προβατίνες 75 kg
- Χρωματισμός λευκός σε όλα τα μέρη του σώματος. Πολύ λίγα ζώα φέρουν στίγματα στο πρόσωπο και τα αυτιά
- Ομοιότητα με την Ιταλική φυλή Bergamasca



Φυλή Ζακύνθου 2/2

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συντελεστής πολυδυμίας: 1,39
- Γαλακτοπαραγωγή υψηλή, υπερβαίνει τα 200 kg κατά προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Κριός φυλής Ζακύνθου
(αρχείο Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Θράκης (Kivircik)

- Μικρόσωμο
- Υ.Α.: κριοί 63 cm, προβατίνες 56 cm
- Σ. Β.: κριοί 47 kg, προβατίνες 33 kg
- Ομοιόμαλλο

- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1
- Τα αρνιά θηλάζουν 3 μήνες
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 50 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Πρόβατο φυλής Θράκης (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Σαρακατσάνικο πρόβατο

- Μικρόσωμο & ανθεκτικό σε πορείες
- Υ.Α.: κριοί 65 cm, προβατίνες 56 cm
- Σ. Β.: κριοί 69 kg, προβατίνες 41 kg
- Αναμικόμαλλο
- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1
- Τα αρνιά θηλάζουν 3 μήνες
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 50 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Κριός Σαρακατσάνικης φυλής (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Προβατίνα Σαρακατσάνικης φυλής (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Κοκοβίτικο πρόβατο

- Σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου (Νομοί Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας)
- 700 – 1.500 άτομα
- Μικρόσωμο
- Αναμικόμαλλο



Κοκοβίτικο πρόβατο (αρχείο εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Αγρινίου 1/2

Περιγραφικά στοιχεία

- 450 καθάραιμα πρόβατα της φυλής εκτρέφονται στο Αγρίνιο και την Αμφιλοχία
- Μεγαλόσωμο, αναμικόμαλλο
- Υ.Α.: κριοί 76 cm, προβατίνες 67 cm
- Σ. Β.: κριοί 72 kg, προβατίνες 58 kg
- Λευκός χρωματισμός στο σώμα, μελανές κηλίδες γύρω από τους οφθαλμούς ή στα αυτιά, το στόμα και τα άκρα.



Πρόβατο Αγρινίου 2/2

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,2
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 120 - 150 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο



Κριός Αγρινίου (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Αιγαιοπελαγίτικο πρόβατο

- Περισσότερα από 100.000 καθάραιμα ζώα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου (Σαμοθράκη, Λήμνος, Σκύρος, Μήλος κ.α. και στην Κρήτη (Σητεία).
- Μικρόσωμο.
- Σ.Β: κριοί 50 kg, προβατίνες 30 kg
- Ο χρωματισμός ποικίλλει έντονα.
- Λεπτά και πολύ ισχυρά άκρα.
- Λεπτόουρο. Αναμικόμαλλο.
- Συντελεστής πολυδυμίας 0,9
- Γαλακτοπαραγωγή 40 kg



Κριός αιγαιοπελαγίτικου πληθυσμού (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Ανωγείων (Ψηλορείτικο)

- Εκτρέφεται σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα στον Ψηλορείτη και αριθμεί 4.500 – 5.000 ζώα σε 19 ποιμνία
- Μικρόσωμο
- Υ.Α.: προβατίνες 57 cm
- Σ. Β.: προβατίνες 27 kg



Προβατίνα Ανωγείων (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Αστερουσίων 1/2

- Εκτρέφεται στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, νότια της πεδιάδας της Μεσσαράς
- Μικρόσωμο
- Αναμικτόμαλλο



Ποίμνιο με πρόβατα Αστερουσίων (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Αστερουσίων 2/2



Προβατίνα Αστερουσίων
(αρχείο Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Κριός Αστερουσίων
(αρχείο Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Κοζάνης 1/3

- Πρόκειται για έναν πληθυσμό προβάτων που εκτρέφεται στη βόρεια Ελλάδα σε ορεινές περιοχές. Φέρει γονίδια φυλών που έχουν εξαφανιστεί (Σαρακατσάνικο, Αρβανιτοβλάχικο, Γραμμουστιανό) καθώς και ποσοστό γονιδίων της Καραγκούνικης και Χιώτικης φυλής.



Προβατίνα Κοζάνης
(αρχείο
Εργαστηρίου
Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Κοζάνης 2/3

- Ύψος ακρωμίου στα θηλυκά 60 – 62 cm
- και βάρος 42 – 45 kg.
- Μέση γαλακτοπαραγωγή 80 – 100 kg.
- Πολυδυμία 110-120%.



Πρόβατα Κοζάνης που εκτρέφονται στον κτηνοτροφικό Σταθμό Βλάστης Κοζάνης (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Κοζάνης 3/3



Πρόβατα Κοζάνης που εκτρέφονται στον κτηνοτροφικό Σταθμό Βλάστης Κοζάνης (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Άργους 1/2

- Μεγαλόσωμο, αναμικόμαλλο
- Υ.Α.: κριοί 85 cm, προβατίνες 70 cm
- Σ. Β.: κριοί 70 kg, προβατίνες 59 kg
- Λευκός χρωματισμός στο σώμα, μαύρο πρόσωπο με λευκή την κορυφή της κεφαλής



Ημιπαχύουρη φυλή Άργους (Άργος) (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Κριός φυλής Άργους (Μεσσηνία) (αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Φυλή Άργους 2/2

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,5 -1,8
- Γαλακτοπαραγωγή : ~ 150 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο 150- 180 ημερών



Κριός της φυλής Άργους (Μεσσηνία)
(αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Προβατίνες Αργίτικης φυλής
(αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Πρόβατο Ευδήλου Ικαρίας

- Μέσης έως μεγάλης σωματικής ανάπτυξης
- Υ.Α.: κριοί 74 cm, προβατίνες 66 cm
- Σ. Β.: κριοί 60 kg, προβατίνες 47 kg
- Ομοιόμαλλο – μερικά άτομα αναμικτόμαλλα
- Λευκός χρωματισμός στο σώμα, το κεφάλι και τα άκρα
- Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,5
- Γαλακτοπαραγωγή : > 150 kg / προβατίνα και αμελκτική περίοδο
- 30 άτομα σε ένα ποίμνιο



Ημιπαχύουρο πρόβατο Ευδήλου Ικαρίας
(αρχείο Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας).



Βιβλιογραφία

- Ζυγογιάννης Δ. (2006): Προβατοτροφία, Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Α), εκδ. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.
- Κατσαούνης Ν. (1994): Προβατοτροφία, Εκδ. οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
- Ρογδάκης Εμμ. (2002): Εγχώριες φυλές προβάτων, Εκδόσεις Αγροτύπος.
- Ρογδάκης Εμμ. (2006): Γενική Ζωοτεχνία, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
- <http://www.provataserron.gr/>